

## **INFORMACJA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW**

W Europie wybito już tysiące sztuk drobiu z powodu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wariant wirusa, który spowodował wybuch obecnie występujących ognisk tej choroby charakteryzuje się wysoką zaraźliwością przy niespecyficznym objawach chorobowych, takich jak:

- apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji, umiarkowana śmiertelność.

Źródłem zakażenia dla drobiu domowego są dzikie ptaki i ptaki domowe już zakażone.

Gospodarstwa indywidualne są szczególnie narażone na wystąpienie choroby, ponieważ drób jest utrzymywany w systemie otwartym, porusza się w obrębie gospodarstwa po terenie, który może być zanieczyszczony przez odchody ptaków dzikich lub pośrednio wirus może zostać zawleczony w te miejsca na podszwach butów, kołach pojazdów lub też dostać się tam z wodą opadową, która spłynęła z zewnątrz.

Dlatego należy zminimalizować możliwość kontaktu drobiu z wirusem, szczególnie, jeżeli gospodarstwo położone jest na trasach przelotów ptaków wędrownych bądź w pobliżu miejsc ich bytowania.

Pomieszczenia, w których utrzymywany jest drób:

- drób należy poić i karmić jedynie w pomieszczeniach,
- pomieszczenia dla drobiu należy zabezpieczyć przed dostępem dzikich ptaków i gryzoni, które również mogą przenieść wirusa do kurnika: należy zamontować siatki w oknach oraz zlikwidować nieszczelności pomieszczeń.

Zagrody:

- zabezpieczyć miejsca na terenie gospodarstwa gdzie przebywa drób przed dzikimi ptakami oraz przed zanieczyszczeniem tych miejsc przez odchody dzikich ptaków,
- miejsca na terenie gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób powinny być ogrodzone, nie mogą to być miejsca ogólnodostępne, po których poruszają się inne zwierzęta, osoby niesprawujące opieki nad drobiem i samochody.

Pasza:

- pasze dla drobiu muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem lub gryzoniami.

Obsługa:

- prace przy drobiu należy wykonywać w specjalnie do tego przeznaczonej odzieży lub odzieży jednorazowej, tak aby nie przenieść wirusa na ubraniu czy podszwach butów,
- należy zaopatrzyć gospodarstwo w środki dezynfekcyjne i maty dezynfekcyjne,
- osoby sprawujące opiekę nad drobiem w gospodarstwie nie powinny uczestniczyć w pracach na fermach drobiu lub innych gospodarstwach utrzymujących drób.

Należy zwracać uwagę na stan zdrowia ptaków domowych i przy zaobserwowaniu niepokojących objawów wzywać lekarza weterynarii.